

## Nektarodárné biopásy

Podmínky platné k 10. 2. 2016 na základě Nařízení vlády ze dne 8. 4. 2015 a zařazených změn z připomínkového řízení v zimě 2015

Výše dotace: 591 Euro/ha/rok = 15 971 Kč/ha/rok

- celková doba trvání závazku: 5 let
- minimální plocha biopásů na podniku: 2 ha
- maximální plocha jednoho biopásu na dílu půdního bloku: 20 %
- Pás se seje na jaře. Délka vegetace pásu: **dvouletý až tříletý**, následné zaorání v období od 31. 3. do 15. 6. následujícího roku a obnovení pásu na stejném místě nebo jinde na stejném půdním bloku či jiném půdním bloku v rámci bloků nahlášených v prvotní žádosti.
- **směs certifikovaného osiva bez povinnosti předložit míchací protokol** (lze namíchat z certifikovaného osiva na podniku) – seznam druhů vizte níže
- setí: do 15. 6., ve směru orby
- **seč s odvozem pokosené biomasy:** 1. 7. – 15. 9.
- **šířka biopásu: 6 - 24 m**
- minimální délka pásu: 30 m
- minimální vzdálenost mezi pásy na jednom dílu půdního bloku: 50 m
- minimální vzdálenost od dálnic a silnic 1. a 2. třídy: 50 m
- zákaz aplikace pesticidů a hnojiv, výjimkou bodová aplikace herbicidů na povolení ÚKZÚZ
- nepoužívat biopás k pojezdům zemědělské techniky a jako souvatř

---

**SMĚS CERTIFIKOVANÉHO OSIVA je složena z následujících kategorií a druhů:**

- **jednoleté „plodiny“: 5 – 7 kg/ha, min. 2 druhy**  
svazanka vratičolistá, pohanka obecná, hořčice bílá
- **víceleté „byliny“: 2,5 - 5 kg/ha, min. 1 druh**  
kmín setý, mrkev krmná, sléz, divizna
- **jeteloviny: min. 15 kg/ha, min. 4 druhy**  
jetel luční, vojtěška setá, úročník bolhoj, vičenec ligrus, vikev setá, čičorka pestrá, komonice bílá

---

**Doporučení:**

### Volba stanoviště

Přednostní volba stanoviště s horším výživovým stavem půdy, s minimálním výskytem vytrvalých plevelů.

### Příprava pozemku

Na podzim střední orba a plošná aplikace herbicidu.

Na jaře dvojí kultivace půdy, případně i použití herbicidu.

- 1) stržení ornice a prokypření svrchní vrstvy za účelem podpory vzejití plevelů při povrchu ornice (disk a rotační brány)
- 2) po 3-4 týdnech, těsně před setím: mělké stržení ornice a příprava jemného seťového lůžka za účelem odstranění vzcházejících plevelů a rozbití hrud v povrchové vrstvě ornice (rotační brány, kompaktor)

### **Setí**

Co nejdříve zjara po pominutí rizika přízemních mrazíků: březen až duben. Hloubka setí do 0,5 – 1 cm s následným uválením.

### **Seč**

V roce založení doporučujeme seč po odkvětu jednoletých rostlin, tedy okolo poloviny července, která v případě příznivých vláhových podmínek umožní opětovné kvetení porostu od září. Nejpozději seč doporučujeme provést na konci srpna, aby měly jeteloviny čas do zimy obrazit.

V druhém a třetím roce vegetace je seč vhodná co nejdříve v červenci po odkvětu jetelů nebo během jejich dokvétání. Toto je důležité pro zachvání jetelů v porostu. V polovině srpna může potom porost opět kvést.

Sestavila  
Ing. Anna Šrámková, Česká zemědělská univerzita v Praze  
anna.sramek@gmail.com

dne 2. března 2017